

## ANEXO N° 1: condiciones de uso

La persona para ser considerada para recibir inmunoglobulina intravenosa debe de cumplir con los siguientes criterios clínicos los cuales deben estar acreditados por el médico tratante al momento de solicitar la aprobación del medicamento al Comité Farmacoterapéutico correspondiente en cada paciente específico:

<b>Diagnostico o condición de salud</b>	Enfermedad de Kawasaki
<b>Grupo etario</b>	Pacientes menores de 18 años
<b>Tiempo máximo que el comité Farmacoterapeutico puede autorizar el uso del medicamento en cada paciente</b>	Dosis única de IGIV de 2g/kg
<b>Condición clínica del paciente para ser apto de recibir el medicamento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pacientes con criterios para diagnóstico de EK (según Tabla 1) y</li> <li>- con enfermedad menor a 10 días (el primer día de fiebre se considera como primer día de enfermedad)</li> </ul>
<b>Presentar la siguiente información ADICIONAL debidamente documentada en el expediente del paciente de solicitud del medicamento</b>	Ecocardiograma bidimensional o angiograma coronario Hemograma Proteína C reactiva, VSG Transaminasas, albumina Electrolitos
<b>Presentar la siguiente información debidamente documentada al término de la administración del tratamiento y al seguimiento con el anexo 07 de la Directiva N° 003-IETSI-ESSALUD-2016</b>	Hemograma Proteína C reactiva, VSG Transaminasas



**Tabla 1: Criterios diagnósticos de la enfermedad de Kawasaki clásica: fiebre por al menos 5 días\* y al menos cuatro de los siguientes cinco signos clínicos**

Signo clínico	Frecuencia (%)
Cambios de la cavidad oral y labios: labios cuarteados y eritematosos, lengua en fresa	96.5
Rash polimórfico: maculopaular, eritema multiforme-como escarlatiforme, que afecta las extremidades, el tronco y las regiones perineales	96.0
Conjuntivitis bilateral no purulenta	89.0
Cambios en las extremidades (eritema de las manos y pies, descamación de las manos y dedos de los pies en la semana 2 y 3)	75.6
Linfadenopatía cervical (> 1.5 cm de diámetro), generalmente unilateral	62.7

Fuente: Saguil et al

\* Los pacientes con fiebre al menos por 5 días y con menos de 4 signos clínicos pueden ser diagnosticados de EK cuando se detecten anomalías de las arterias carótidas por medio de ecocardiografía 2D o angiografía.



**Tabla 2: Escala de gravedad de Harada**

Puntuación de la escala de Harada (positivo si se cumple 4 de 7 de los siguientes)	
1.	Leucocitos > 12 000/ $\mu$ L
2.	Plaquetas <350 000/ $\mu$ L
3.	PCR (proteína C reactiva) >3 mg/dL
4.	Hematocrito <35% (o < 11.6 g/dL)
5.	Albumina <3.5 g/dL
6.	Edad $\leq$ 12 meses
7.	Sexo masculino

