

ANEXO N° 1: condiciones de uso

La persona para ser considerada para recibir Omalizumab, debe de cumplir con los siguientes criterios clínicos los cuales deben estar acreditados por el médico tratante al momento de solicitar la aprobación del medicamento al Comité Farmacoterapéutico correspondiente en cada paciente específico:



Diagnostico o condición de salud	Asma alérgica mediada por IgE persistente severa.
Grupo etario	Pacientes adultos, mayores de 18 años.
Tiempo máximo que el CFT puede autorizar el uso del medicamento	16 semanas (4 ciclos).
Condición clínica del paciente para ser apto de recibir el medicamento	<ul style="list-style-type: none"> - Paciente con diagnóstico de asma alérgico mediado por IgE. - Asma persistente severo con requerimiento de >1000 µg/día de dipropionato de beclometasona o equivalente, y un beta 2 agonista de acción prolongada. - Enfermedad no controlada a pesar del uso optimizado del tratamiento* - Necesidad continua o frecuente de tratamiento con corticoides orales (requerimiento de 4 o más cursos en el año previo).
Presentar la siguiente información ADICIONAL debidamente documentada on el expediente del paciente de solicitud del medicamento	<ul style="list-style-type: none"> - Prueba de "skin prick" positivo a ≥ 1 aero alérgeno común. - Nivel de IgE. - Volumen espiratorio forzado en 1 segundo VEF1. - Flujo espiratorio pico (PEF). - Dosis requerida de uso de corticoides inhalado. - Dosis requerida de uso de corticoides orales (historial de uso de corticoides en el último año).





Presentar la siguiente información debidamente documentada al término de la administración del tratamiento y al seguimiento con el anexo 07 de la Directiva N° 003-IETSI-ESSALUD-2016

- Volumen espiratorio forzado en 1 segundo VEF1.
- Flujo espiratorio pico (PEF).
- Dosis requerida de uso de corticoides inhalado.
- Dosis requerida de uso de corticoides orales (solo en los casos que se use corticoides orales).
- Reacciones adversas.
- Numero de exacerbaciones que requirieron atención médica.
- Hospitalizaciones.
- Test de Calidad de vida.
- Test de control del asma.

** Tratamiento optimizado: un curso con corticoides inhalados a altas dosis, beta 2 de acción prolongada, antagonistas de receptores de leucotrienos, anticolinérgicos de acción prolongada, teofilina (excepto para los pacientes intolerantes a teofilina).*

