

IETSI EsSalud
Instituto de Evaluación de Tecnologías en
Salud e Investigación

FICHA TÉCNICA

Glaucoma de Ángulo Abierto

**Indicadores para evaluación de la adherencia de la guía de práctica clínica de
Glaucoma de Ángulo Abierto**

	Página
Indicador 1: Monoterapia en Glaucoma primario de ángulo abierto.	2
Indicador 2: GPAA leve o moderado, realizar trabeculoplastia en GPAA de reciente diagnóstico con mala adherencia al tratamiento farmacológico	4
Indicador 3: GPAA e indicación de trabeculectomía, administrar antimetabolitos como tratamiento adyuvante	6

Indicador 1:

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR	
Código del Indicador	49.1
Nombre del indicador de adherencia	Monoterapia en Glaucoma primario de ángulo abierto (GPAA).
Tipo de indicador	Resultados
Recomendación trazadora de la GPC	En adultos con GPAA leve o moderado, recomendamos administrar un análogo de prostaglandina como monoterapia de primera elección.
Definición operacional del indicador	Con este indicador se pretende valorar el porcentaje de adultos con GPAA leve o moderado, a quienes se les haya prescrito un análogo de prostaglandina como monoterapia de primera elección.
Unidad de medida del indicador	Proporción
Fórmula de cálculo del indicador	Relación porcentual entre el número de pacientes adultos con GPAA leve o moderado (CIE 10: H40.1), a quienes se les haya prescrito un análogo de prostaglandina como monoterapia (SAP: 010900047) de primera elección entre la cantidad total de pacientes adultos con GPAA leve o moderado (CIE 10: H40.1) atendidos en el periodo del 01 de enero del 2021 al 31 de diciembre 2021 * 100%
	<p>Numerador: pacientes adultos con GPAA leve o moderado (CIE 10: H40.1), a quienes se les haya prescrito un análogo de prostaglandina (SAP: 010900047) como monoterapia de primera elección atendidos en el periodo del 01 de enero del 2021 al 31 de diciembre 2021</p> <p>Denominador: pacientes adultos con GPAA leve o moderado (CIE 10: H40.1) atendidos en el periodo del 01 de enero del 2021 al 31 de diciembre 2021</p>
Población objetivo	Pacientes adultos con GPAA leve o moderado atendidos en el periodo del 01 de enero del 2021 al 31 de diciembre 2021
Criterios de inclusión/exclusión	<p>Criterios de inclusión:</p> <p>Numerador: Pacientes adultos con GPAA leve o moderado, a quienes se les haya prescrito un análogo de prostaglandina como monoterapia de primera elección atendidos en el periodo del 01 de enero del 2021 al 31 de diciembre 2021</p> <p>Denominador: Pacientes adultos con GPAA leve o moderado elección atendidos en el periodo del 01 de enero del 2021 al 31 de diciembre 2021</p>

	<p>Criterios de exclusión</p> <p>Numerador: Pacientes adultos sin GPAA, a quienes se les haya prescrito un análogo de prostaglandina como monoterapia de primera elección atendidos en el periodo del 01 de enero del 2021 al 31 de diciembre 2021</p> <p>Denominador: Pacientes adultos con GPAA leve o moderado elección atendidos fuera del periodo del 01 de enero del 2021 al 31 de diciembre 2021</p>
Fuentes de los datos	<p>La Fuente de información será en base a datos obtenido del ESSI, de dónde obtendremos las historias clínicas en el periodo de 01 de enero del 2021 al 31 de diciembre 2021 y de las cuales se va a seleccionar la población de estudio y se va analizar cada caso, se ingresará al sistema para obtener los datos de las historias clínicas electrónicas.</p>
Periodicidad de medición	<p>Anual</p>
Meta del indicador	<p>La meta esperada es que nuestro indicador sea mayor al 80%, con ello valoraremos el porcentaje de cumplimiento de la GPC (adherencia alta).</p>
Nivel de desagregación	<p>El mínimo nivel de desagregación es la historia clínica electrónica la cual contenga los datos de la atención del paciente.</p>
Responsables	<p>Equipo de evaluación de adherencias a las guías de práctica clínica.</p>

Indicador 2:

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR	
Código del Indicador	49.2
Nombre del indicador de adherencia	GPAA leve o moderado, realizar trabeculoplastia en GPAA de reciente diagnóstico con mala adherencia al tratamiento farmacológico
Tipo de indicador	Resultados
Recomendación trazadora de la GPC	En adultos con GPAA leve o moderado, sugerimos realizar trabeculoplastia láser en alguno de los siguientes casos: Como tratamiento inicial en casos de GPAA de reciente diagnóstico en los que se prevé mala adherencia al tratamiento farmacológico.
Definición operacional del indicador	Con este indicador se pretende valorar el porcentaje de adultos con GPAA leve o moderado en los que se haya realizado trabeculoplastia láser como tratamiento inicial (6 meses desde el diagnóstico)
Unidad de medida del indicador	Proporción
Fórmula de cálculo del indicador	Relación porcentual entre el número de pacientes adultos con GPAA leve o moderado (CIE 10: H40.1) en los que se haya realizado trabeculoplastia láser (CPT: 65855) como tratamiento inicial (6 meses desde el diagnóstico) atendidos en el periodo del 01 de enero del 2021 al 31 de diciembre 2021 entre la cantidad total de pacientes adultos con GPAA leve o moderado (CIE 10: H40.1) (que tengan diagnóstico inicial desde hace 6 meses) atendidos en el periodo del 01 de enero del 2021 al 31 de diciembre 2021 * 100%
	Numerador: pacientes adultos con GPAA leve o moderado (CIE 10: H40.1) en los que se haya realizado trabeculoplastia láser (CPT: 65855) como tratamiento inicial (6 meses desde el diagnóstico) atendidos en el periodo del 01 de enero del 2021 al 31 de diciembre 2021
	Denominador: pacientes adultos con GPAA leve o moderado (CIE 10: H40.1) (que tengan diagnóstico inicial desde hace 6 meses) atendidos en el periodo del 01 de enero del 2021 al 31 de diciembre 2021
Población objetivo	Pacientes adultos con GPAA leve o moderado (que tengan diagnóstico inicial desde hace 6 meses) atendidos en el periodo del 01 de enero del 2021 al 31 de diciembre 2021
Criterios de inclusión/exclusión	Criterios de inclusión: Numerador: Pacientes adultos con GPAA leve o moderado en los que se haya realizado trabeculoplastia láser como tratamiento inicial (6 meses desde el diagnóstico) atendidos en el periodo del 01 de enero del 2021 al 31 de diciembre 2021

	<p>Denominador: Pacientes adultos con GPAA leve o moderado (que tengan diagnóstico inicial desde hace 6 meses) atendidos en el periodo del 01 de enero del 2021 al 31 de diciembre 2021</p> <p>Criterios de exclusión</p> <p>Numerador: Pacientes adultos con GPAA leve o moderado en los que no se haya realizado trabeculoplastia láser como tratamiento inicial (6 meses desde el diagnóstico) atendidos en el periodo del 01 de enero del 2021 al 31 de diciembre 2021</p> <p>Denominador: Pacientes adultos con GPAA leve o moderado (que tengan diagnóstico inicial desde hace 6 meses) atendidos fuera del periodo del 01 de enero del 2021 al 31 de diciembre 2021</p>
Fuentes de los datos	<p>La Fuente de información será en base a datos obtenido del ESSI, de dónde obtendremos las historias clínicas en el periodo de 01 de enero del 2021 al 31 de diciembre 2021 y de las cuales se va a seleccionar la población de estudio y se va analizar cada caso, se ingresará al sistema para obtener los datos de las historias clínicas electrónicas.</p>
Periodicidad de medición	<p>Anual</p>
Meta del indicador	<p>La meta esperada es que nuestro indicador sea mayor al 80%, con ello valoraremos el porcentaje de cumplimiento de la GPC (adherencia alta).</p>
Nivel de desagregación	<p>El mínimo nivel de desagregación es la historia clínica electrónica la cual contenga los datos de la atención del paciente.</p>
Responsables	<p>Equipo de evaluación de adherencias a las guías de práctica clínica.</p>

Indicador 3:

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR	
Código del Indicador	49.3
Nombre del indicador de adherencia	GPAA e indicación de trabeculectomía, administrar antimetabolitos como tratamiento adyuvante
Tipo de indicador	Resultados
Recomendación trazadora de la GPC	En adultos con GPAA e indicación de trabeculectomía, sugerimos administrar antimetabolitos (mitomicina-C intraoperatoria y/o postoperatorio o 5-fluorouracilo postoperatorio) como tratamiento adyuvante, luego de realizar un cuidadoso balance de beneficios y daños para cada paciente.
Definición operacional del indicador	Con este indicador se pretende valorar el porcentaje de adultos con GPAA e indicación de trabeculectomía, que hayan empleado antimetabolitos (mitomicina-C intraoperatoria y/o postoperatorio o 5-fluorouracilo postoperatorio) como tratamiento adyuvante.
Unidad de medida del indicador	Proporción
Fórmula de cálculo del indicador	Relación porcentual entre el número de pacientes adultos con GPAA (CIE 10: H40.1) e indicación de trabeculectomía (CPT: 65850), que hayan empleado antimetabolitos (mitomicina-C intraoperatoria (SAP: 010350062, 010350160) y/o postoperatorio o 5-fluorouracilo (SAP: 010350037, 010350039) postoperatorio) como tratamiento adyuvante atendidos en el periodo del 01 de enero del 2021 al 31 de diciembre 2021 entre la cantidad total de pacientes adultos con GPAA (CIE 10: H40.1) e indicación de trabeculectomía (CPT: 65850), atendidos en el periodo del 01 de enero del 2021 al 31 de diciembre 2021 * 100%
	Numerador: pacientes adultos con GPAA (CIE 10: H40.1) e indicación de trabeculectomía (CPT: 65850), que hayan empleado antimetabolitos (mitomicina-C intraoperatoria (SAP: 010350062, 010350160) y/o postoperatorio o 5-fluorouracilo (SAP: 010350037, 010350039) postoperatorio) como tratamiento adyuvante atendidos en el periodo del 01 de enero del 2021 al 31 de diciembre 2021
	Denominador: pacientes adultos con GPAA (CIE 10: H40.1) e indicación de trabeculectomía (CPT: 65850), atendidos en el periodo del 01 de enero del 2021 al 31 de diciembre 2021
Población objetivo	Pacientes adultos con GPAA leve o moderado atendidos en el periodo del 01 de enero del 2021 al 31 de diciembre 2021

<p>Criterios de inclusión/exclusión</p>	<p>Criterios de inclusión:</p> <p>Numerador: Pacientes adultos con GPAA e indicación de trabeculectomía, que hayan empleado antimetabolitos (mitomicina-C intraoperatoria y/o postoperatorio o 5-fluorouracilo postoperatorio) como tratamiento adyuvante atendidos en el periodo del 01 de enero del 2021 al 31 de diciembre 2021</p> <p>Denominador: Pacientes adultos con GPAA e indicación de trabeculectomía, atendidos en el periodo del 01 de enero del 2021 al 31 de diciembre 2021</p> <p>Criterios de exclusión</p> <p>Numerador: Pacientes adultos con GPAA sin indicación de trabeculectomía, que hayan empleado antimetabolitos (mitomicina-C intraoperatoria y/o postoperatorio o 5-fluorouracilo postoperatorio) como tratamiento adyuvante atendidos en el periodo del 01 de enero del 2021 al 31 de diciembre 2021</p> <p>Denominador: Pacientes adultos con GPAA e indicación de trabeculectomía, atendidos fuera del periodo del 01 de enero del 2021 al 31 de diciembre 2021</p>
<p>Fuentes de los datos</p>	<p>La Fuente de información será en base a datos obtenido del ESSI, de dónde obtendremos las historias clínicas en el periodo de 01 de enero del 2021 al 31 de diciembre 2021 y de las cuales se va a seleccionar la población de estudio y se va analizar cada caso, se ingresará al sistema para obtener los datos de las historias clínicas electrónicas.</p>
<p>Periodicidad de medición</p>	<p>Anual</p>
<p>Meta del indicador</p>	<p>La meta esperada es que nuestro indicador sea mayor al 80%, con ello valoraremos el porcentaje de cumplimiento de la GPC (adherencia alta).</p>
<p>Nivel de desagregación</p>	<p>El mínimo nivel de desagregación es la historia clínica electrónica la cual contenga los datos de la atención del paciente.</p>
<p>Responsables</p>	<p>Equipo de evaluación de adherencias a las guías de práctica clínica.</p>