

IETSI EsSalud
Instituto de Evaluación de Tecnologías en
Salud e Investigación

FICHAS TÉCNICAS

Guía de Práctica Clínica para el
tratamiento farmacológico de
Nefritis lúpica

Indicadores para evaluación de la adherencia de la Guía de Práctica Clínica para el tratamiento farmacológico de Nefritis Lúpica

	Página
Indicador 1: Nefritis Lúpica clase I a V no refractarios, se debe coadministrar antimaláricos	2
Indicador 2: Nefritis Lúpica clase III a IV no refractarios, administrar glucocorticoides – MMF en lugar de CYC	4
Indicador 3: NL clase V no refractarios, administrar glucocorticoides – MMF en lugar de CYC	6

Indicador 1:

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR	
Código del Indicador	47.1
Nombre del indicador de adherencia	Nefritis Lúpica (NL) clase I a V no refractarios, se debe coadministrar antimaláricos
Tipo de indicador	Resultados
Recomendación trazadora de la GPC	En adultos con NL clase I a V no refractarios, se debe coadministrar antimaláricos (ej. hidroxicloroquina a dosis que no exceda los 5 mg/kg/día vía oral y disminuirla gradualmente) como parte del cuidado estándar durante las fases de inducción y mantenimiento.
Definición operacional del indicador	Con este indicador se pretende valorar el porcentaje de pacientes adultos con NL clase I a V no refractarios, a quienes se les ha administrado antimaláricos durante las fases de inducción y mantenimiento.
Unidad de medida del indicador	Proporción
Fórmula de cálculo del indicador	Relación porcentual entre el número de pacientes adultos con NL clase I a V no refractarios (CIE 10: M32.1 - N08.5), a quienes se les ha administrado antimaláricos (SAP: 010050015) durante las fases de inducción y mantenimiento entre la cantidad total de pacientes adultos con NL clase I a V no refractarios (CIE 10: M32.1 - N08.5), atendidos en el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2021 * 100%
	<p>Numerador: cantidad de pacientes adultos con NL clase I a V (CIE 10: M32.1 - N08.5) No refractarios, a quienes se les ha administrado antimaláricos (SAP: 010050015) durante las fases de inducción y mantenimiento atendidos en el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2021</p> <p>Denominador: pacientes adultos con NL clase I a V (CIE 10: M32.1 - N08.5) no refractarios atendidos en el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2021</p>
Población objetivo	Pacientes adultos con NL clase I a V no refractarios atendidos en el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2021.
Criterios de inclusión/exclusión	<p>Criterios de inclusión:</p> <p>Numerador: Pacientes adultos con NL clase I a V no refractarios, a quienes se les ha administrado antimaláricos durante las fases de inducción y mantenimiento atendidos en el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2021</p> <p>Denominador: Pacientes adultos con NL clase I a V no refractarios atendidos en el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2021</p>

	<p>Criterios de exclusión</p> <p>Numerador: Pacientes adultos sin NL, a quienes se les ha administrado antimaláricos atendidos en el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2021</p> <p>Denominador: Pacientes adultos con NL clase I a V no refractarios atendidos fuera del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2021</p>
Fuentes de los datos	<p>La Fuente de información será en base a datos obtenido del ESSI, de dónde obtendremos las historias clínicas en el periodo de 01 de enero del 2021 al 31 de diciembre 2021 y de las cuales se va a seleccionar la población de estudio y se va analizar cada caso, se ingresará al sistema para obtener los datos de las historias clínicas electrónicas.</p>
Periodicidad de medición	<p>Anual</p>
Meta del indicador	<p>La meta esperada es que nuestro indicador sea mayor al 80%, con ello valoraremos el porcentaje de cumplimiento de la GPC (adherencia alta).</p>
Nivel de desagregación	<p>El mínimo nivel de desagregación es la historia clínica electrónica la cual contenga los datos de la atención del paciente.</p>
Responsables	<p>Equipo de evaluación de adherencias a las guías de práctica clínica.</p>

Indicador 2:

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR	
Código del Indicador	47.2
Nombre del indicador de adherencia	NL clase III a IV no refractarios, administrar glucocorticoides – MMF en lugar de CYC
Tipo de indicador	Resultados
Recomendación trazadora de la GPC	En adultos con NL clase III a IV no refractarios, utilizar glucocorticoides con micofenolato mofetil (MMF) en lugar de ciclofosfamida (CYC), como terapia inicial de la fase de inducción.
Definición operacional del indicador	Con este indicador se pretende valorar el porcentaje de pacientes adultos con NL clase III a IV no refractarios, que empleen la combinación de glucocorticoides más micofenolato mofetil en lugar de ciclofosfamida, como terapia inicial de la fase de inducción.
Unidad de medida del indicador	Proporción
Fórmula de cálculo del indicador	Relación porcentual entre el número de pacientes adultos con NL clase III a IV no refractarios (CIE 10: M32.1 - N08.5 + CPT: 50200, 50205) , que han empleado glucocorticoides (SAP: 010050041, 010150010, 010150009) con micofenolato mofetil (MMF) (SAP: 010350141, 010350065) como terapia inicial de la fase de inducción atendidos en el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2021 entre la cantidad total de pacientes adultos con NL clase III a IV no refractarios (CIE 10: M32.1 - N08.5 + CPT: 50200, 50205), atendidos en el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2021 * 100%
	Numerador: cantidad de pacientes adultos con NL clase III a IV no refractarios (CIE 10: M32.1 - N08.5 + CPT: 50200, 50205), que han empleado glucocorticoides (SAP: 010050041, 010150010, 010150009) con micofenolato mofetil (MMF) (SAP: 010350141, 010350065) como terapia inicial de la fase de inducción atendidos en el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2021. Denominador: pacientes adultos con NL clase III a IV (CIE 10: M32.1 - N08.5 + CPT: 50200, 50205) no refractarios atendidos en el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2021
Población objetivo	Pacientes adultos con NL clase III a IV no refractarios atendidos en el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2021
Criterios de inclusión/exclusión	Criterios de inclusión: Numerador: Pacientes adultos con NL clase III a IV no refractarios que han empleado glucocorticoides con micofenolato mofetil (MMF), como terapia inicial de la fase de inducción atendidos en el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2021

	<p>Denominador: Pacientes adultos con NL clase III a IV no refractarios atendidos en el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2021</p> <p>Criterios de exclusión</p> <p>Numerador: Pacientes adultos con NL clase III a IV no refractarios que no han empleado glucocorticoides con micofenolato mofetil (MMF), como terapia inicial de la fase de inducción atendidos en el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2021</p> <p>Denominador: Pacientes adultos con NL clase III a IV no refractarios atendidos fuera del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2021</p>
Fuentes de los datos	<p>La Fuente de información será en base a datos obtenido del ESSI, de dónde obtendremos las historias clínicas en el periodo de 01 de enero del 2021 al 31 de diciembre 2021 y de las cuales se va a seleccionar la población de estudio y se va analizar cada caso, se ingresará al sistema para obtener los datos de las historias clínicas electrónicas.</p>
Periodicidad de medición	Anual
Meta del indicador	<p>La meta esperada es que nuestro indicador sea mayor al 80%, con ello valoraremos el porcentaje de cumplimiento de la GPC (adherencia alta).</p>
Nivel de desagregación	<p>El mínimo nivel de desagregación es la historia clínica electrónica la cual contenga los datos de la atención del paciente.</p>
Responsables	Equipo de evaluación de adherencias a las guías de práctica clínica.

Indicador 3:

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR	
Código del Indicador	47.3
Nombre del indicador de adherencia	NL clase V no refractarios, administrar glucocorticoides – MMF en lugar de CYC
Tipo de indicador	Resultados
Recomendación trazadora de la GPC	En adultos con NL clase V no refractarios, utilizar glucocorticoides con micofenolato mofetil (MMF) en lugar de ciclofosfamida (CYC), como terapia inicial de la fase de inducción.
Definición operacional del indicador	Con este indicador se pretende valorar el porcentaje de pacientes adultos con NL clase V no refractarios, que empleen la combinación de glucocorticoides más micofenolato mofetil en lugar de ciclofosfamida, como terapia inicial de la fase de inducción.
Unidad de medida del indicador	Proporción
Fórmula de cálculo del indicador	Relación porcentual entre el número de pacientes adultos con NL clase V no refractarios (CIE 10: M32.1 - N08.5 + CPT: 50200, 50205) , que han empleado glucocorticoides (SAP: 010050041, 010150010, 010150009) con micofenolato mofetil (MMF) (SAP: 010350141, 010350065) como terapia inicial de la fase de inducción atendidos en el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2021 entre la cantidad total de pacientes adultos con NL clase V no refractarios (CIE 10: M32.1 - N08.5 + CPT: 50200, 50205), atendidos en el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2021 * 100%
	Numerador: cantidad de pacientes adultos con NL clase V no refractarios (CIE 10: M32.1 - N08.5 + CPT: 50200, 50205), que han empleado glucocorticoides (SAP: 010050041, 010150010, 010150009) con micofenolato mofetil (MMF) (SAP: 010350141, 010350065) como terapia inicial de la fase de inducción atendidos en el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2021 Denominador: pacientes adultos con NL clase V (CIE 10: M32.1 - N08.5 + CPT: 50200, 50205) no refractarios atendidos en el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2021
Población objetivo	Pacientes adultos con NL clase V no refractarios atendidos en el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2021
Criterios de inclusión/exclusión	Criterios de inclusión: Numerador: Pacientes adultos con NL clase V no refractarios que han empleado glucocorticoides con micofenolato mofetil (MMF), como terapia inicial de la fase de inducción atendidos en el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2021

	<p>Denominador: Pacientes adultos con NL clase V no refractarios atendidos en el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2021</p> <p>Criterios de exclusión Numerador: Pacientes adultos con NL clase V no refractarios que no han empleado glucocorticoides con micofenolato mofetil (MMF), como terapia inicial de la fase de inducción atendidos en el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2021</p> <p>Denominador: Pacientes adultos con NL clase V no refractarios atendidos fuera del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2021</p>
Fuentes de los datos	<p>La Fuente de información será en base a datos obtenido del ESSI, de dónde obtendremos las historias clínicas en el periodo de 01 de enero del 2021 al 31 de diciembre 2021 y de las cuales se va a seleccionar la población de estudio y se va analizar cada caso, se ingresará al sistema para obtener los datos de las historias clínicas electrónicas.</p>
Periodicidad de medición	<p>Anual</p>
Meta del indicador	<p>La meta esperada es que nuestro indicador sea mayor al 80%, con ello valoraremos el porcentaje de cumplimiento de la GPC (adherencia alta).</p>
Nivel de desagregación	<p>El mínimo nivel de desagregación es la historia clínica electrónica la cual contenga los datos de la atención del paciente.</p>
Responsables	<p>Equipo de evaluación de adherencias a las guías de práctica clínica.</p>