

VIII. ANEXOS

ANEXO N° 1. Condiciones de uso

Los pacientes que serán intervenidos con el sling masculino transobturatriz fijo deben cumplir con los criterios descritos a continuación, los cuales deben ser acreditados por el médico tratante* al momento de solicitar la autorización de uso del dispositivo al jefe de su servicio o departamento.

Diagnóstico/ condición de salud	Adultos varones con incontinencia urinaria de esfuerzo post prostatectomía, de intensidad leve a moderada y que han fallado al tratamiento conservador
Grupo etario	Jóvenes, adultos y adultos mayores
Condiciones clínicas o quirúrgicas del paciente elegible	Incontinencia urinaria de esfuerzo de intensidad leve a moderada, posterior a una prostatectomía, que no responde al tratamiento conservador con ejercicios de piso pélvico.
Presentar la siguiente información debidamente documentada en el expediente de solicitud de uso de la tecnología	Historia clínica del paciente con la siguiente información: <ul style="list-style-type: none"> • Anamnesis y examen físico completo • Pad test de 24 horas • Cistouretroscopia • Estudio urodinámico
Presentar la siguiente información de seguimiento clínico a los 3, 6, 12, 18 y 24 meses posintervención (consignar en la historia clínica)	<ul style="list-style-type: none"> • Pad test de 24 horas • Cuestionario de calidad de vida (ICIQ-UI SF) • Reporte de eventos adversos.

*El médico solicitante de la tecnología debe pertenecer a la especialidad de urología.