

**MEMORANDO CIRCULAR N° 180 -IETSI-ESSALUD-2023**

**PARA:** Señores  
**GERENTES Y DIRECTORES**  
**CENTROS E INSTITUTOS ESPECIALIZADOS**  
**REDES ASISTENCIALES Y REDES PRESTACIONALES**

**DE:** **JUAN ALBERTO SANTILLANA CALLIRGOS**  
Director del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación

**ASUNTO:** Ampliación de vigencia de Dictámenes Preliminares de Evaluación de Tecnologías Sanitarias – IETSI.

**REFERENCIA:** Informe N° 116-SDEPFYOTS-DETS-IETSI-ESSALUD-2023

**FECHA:** Lima, 18 OCT. 2023




Es grato dirigirme a ustedes para saludarlos cordialmente y en relación al asunto, manifestarles que el IETSI ha decidido **AMPLIAR** la vigencia por un año adicional de los dictámenes preliminares aprobatorios y no aprobatorios considerando la fecha de publicación y ampliaciones previas<sup>1</sup> (ver Anexo N° 1).

Asimismo, cabe mencionar que, de requerirse una reconsideración de algún dictamen preliminar publicado, estas pueden ser realizadas por el área usuaria correspondiente sustentando la solicitud con evidencia científica de buena calidad, proveniente de ensayos clínicos de fase III o de un análisis actualizado que responda a la necesidad de los pacientes con la condición clínica a tratar.

Sin otro particular, me despido de ustedes.

Atentamente,



  
-----  
Dr. JUAN SANTILLANA CALLIRGOS  
Director del Instituto de Evaluación  
de Tecnologías en Salud e Investigación  
IETSI - ESSALUD


JASC/eymm/ahhc/ljgc  
NIT: 8301-2023-14

<sup>1</sup> <https://ietsi.essalud.gob.pe/dictamenes-evaluacion-tecnologica/>




**Anexo N° 1: Lista de Dictámenes Preliminares que se amplía vigencia.**


| Dictamen Preliminar    | Producto Farmacéutico  | Problema de Salud  |
|------------------------|--|--|
| N° 047-DETS-IETSI-2022 | Emicizumab   | Pacientes pediátricos con diagnóstico de hemofilia A (deficiencia congénita del factor VIII), con presencia de anticuerpos inhibidores del factor VIII y que fracasan o no son candidatos a la terapia de inmunotolerancia con factor VIII |
| N° 046-DETS-IETSI-2022 | Ceftazidima/Avibactam  | Pacientes adultos con infección urinaria complicada causada por enterobacterias gram-negativas productoras de carbapenemasas   |
| N° 044-DETS-IETSI-2022 | Dexametasona (implante intravítreo de liberación prolongada)     | Pacientes adultos con edema macular secundario a oclusión venosa retiniana con disminución de la agudeza visual y/o incremento o mantenimiento del grosor macular a pesar del uso de tres inyecciones de bevacizumab                       |
| N° 041-DETS-IETSI-2022 | Bosentan   | Pacientes menores de 18 años con hipertensión arterial pulmonar de clase funcional II, III o IV con fracaso al sildenafilio en monoterapia   |
| N° 040-DETS-IETSI-2022 | Óxido nítrico  | Pacientes adultos con hipertensión pulmonar y falla aguda del ventrículo derecho en el período perioperatorio y posoperatorio de cirugía cardiovascular  |
| N° 039-DETS-IETSI-2022 | Nivolumab  | Pacientes adultos con melanoma maligno metastásico o irreseccable que progresa a dos líneas de quimioterapia, con ECOG 0-1   |
| N° 036-DETS-IETSI-2022 | Macitentan   | Pacientes con hipertensión arterial pulmonar de clase funcional II a III con fracaso al sildenafilio en monoterapia y con contraindicación al uso del bosentan   |
| N° 035-DETS-IETSI-2022 | Atezolizumab en combinación con bevacizumab                      | Pacientes adultos con carcinoma hepatocelular no reseccable o metastásico  |
| N° 032-DETS-IETSI-2021 | Daratumumab en combinación con bortezomib, melfalán y prednisona | Pacientes adultos con mieloma múltiple de nuevo diagnóstico no candidatos a trasplante de células progenitoras hematopoyéticas   |
| N° 031-DETS-IETSI-2021 | Fulvestrant  | Pacientes post menopáusicas con cáncer de mama metastásico, receptores hormonales positivos, HER2 negativo, no tributario de quimioterapia ni radioterapia, sin enfermedad visceral y sin tratamiento endocrino previo                     |
| N° 030-DETS-IETSI-2021 | Hipotermia terapéutica de cuerpo completo con mantas térmicas    | Recién nacidos de 35 semanas o más con asfisia perinatal y encefalopatía hipóxica-isquémica moderada o severa  |
| N° 029-DETS-IETSI-2021 | Nivolumab (Actualización)  | Pacientes adultos con carcinoma de células renales metastásico de células claras que han progresado al tratamiento de primera línea con inhibidor de la tirosina quinasa Actualización Dict N° 017-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2017               |
| N° 028-DETS-IETSI-2021 | Sistema coplanar de alineación vertebral                         | Corrección quirúrgica de deformidades de la columna vertebral en pacientes niños, jóvenes y adultos  |
| N° 027-DETS-IETSI-2021 | Ixabepilona  | Cáncer de mama metastásico resistente a antraciclinas, taxanos y capecitabina con estado funcional ECOG 0-1  |
| N° 026-DETS-IETSI-2021 | Ribociclib más un inhibidor de la aromatasa                      | Pacientes premenopáusicas con cáncer de mama metastásico, RH positivo, HER2 negativo, sin crisis visceral, y sin tratamiento sistémico previo para la enfermedad metastásica   |



| Dictamen Preliminar    | Producto Farmacéutico  | Problema de Salud  |
|------------------------|--|--|
| N° 025-DETS-IETSI-2021 | Bosutinib  | Leucemia mieloide crónica con el gen de fusión BCR-ABL, con mutación T315I negativo y con falla y/o intolerancia a imatinib, dasatinib y nilotinib                           |
| N° 024-DETS-IETSI-2021 | Palivizumab  | Prevención de la enfermedad grave causada por el virus sincitial respiratorio en niños con displasia broncopulmonar y antecedente de prematuridad                            |
| N° 023-DETS-IETSI-2021 | Aflibercept  | Degeneración macular relacionada a la edad de tipo neovascular, luego del tratamiento con bevacizumab  |
| N° 022-DETS-IETSI-2021 | Fulvestrant  | Mujeres posmenopáusicas con cáncer de mama metastásico, RH positivo, HER2 negativo y progresión de la enfermedad después del uso de un inhibidor de aromatasas               |
| N° 021-DETS-IETSI-2021 | Tocilizumab  | Pacientes con artritis reumatoide activa con falla o intolerancia al tratamiento con anti-TNF, anti-CD20 y sintético-específico  |
| N° 020-DETS-IETSI-2021 | Fórmula extensamente hidrolizada de proteína con 30 % o más de triglicéridos de cadena media | Manejo nutricional de niños menores de cinco años, con cirrosis hepática colestásica, candidatos a trasplante hepático   |
| N° 019-DETS-IETSI-2021 | Ipilimumab más nivolumab   | Pacientes adultos con melanoma acral lentiginoso metastásico, irrecesable, recurrente, sin tratamiento sistémico previo  |
| N° 018-DETS-IETSI-2021 | Ustekinumab  | Pacientes adultos con enfermedad de Crohn activa de moderada a severa y falla al tratamiento sistémico convencional e inhibidores del TNF-alfa                               |
| N° 017-DETS-IETSI-2021 | Milrinona  | Pacientes pediátricos con síndrome de bajo gasto cardíaco postoperatorio de cardiopatía congénita  |
| N° 016-DETS-IETSI-2021 | Microcatéter compatible con sustancia embolizante de punta desprendible                      | Embolización de malformaciones arteriovenosas cerebrales   |
| N° 015-DETS-IETSI-2021 | Tofacitinib  | Pacientes adultos con colitis ulcerativa moderada a severa y con falla o intolerancia a infliximab   |
| N° 016-DETS-IETSI-2020 | Pembrolizumab (Actualización)  | Pacientes adultos con adenocarcinoma de pulmón metastásico con las mutaciones EGFR y ALK negativos y PD-L1 k 50 % (Actualización del Dict N.° 059-SDEPFYOTS-DETS-IETSI-2017) |
| N° 015-DETS-IETSI-2020 | Trióxido de arsénico   | Pacientes adultos con leucemia promielocítica aguda de riesgo bajo o intermedio recién diagnosticados  |
| N° 014-DETS-IETSI-2020 | Panitumumab más FOLFIRI  | Cáncer colorrectal con gen KRAS no mutado que recibió terapia adyuvante con esquemas de oxaliplatino sin irinotecán y que progresa a metástasis, con ECOG 0-1                |
| N° 013-DETS-IETSI-2020 | Polihexanida 0.1 % más undecilenamidopropil betaina 0.1 %                                    | Pacientes con heridas crónicas en piel   |
| N° 012-DETS-IETSI-2020 | Aterótomo vascular   | Pacientes adultos con enfermedad arterial periférica supra e infra poplítea que no sean elegibles para bypass quirúrgico   |
| N° 010-DETS-IETSI-2020 | Obinutuzumab más clorambucil   | Pacientes adultos mayores de 65 años con leucemia linfocítica crónica sin tratamiento sistémico previo que no son tributarios a fludarabina                                  |



| Dictamen Preliminar              | Producto Farmacéutico                             | Problema de Salud   |
|----------------------------------|---|---|
| N° 009-DETS-IETSI-2020           | Denosumab   | Cáncer de próstata metastásico resistente a la castración y enfermedad renal crónica avanzada   |
| N° 008-DETS-IETSI-2020           | Multivitámicos pediátricos endovenosos            | Pacientes neonatos que reciben nutrición parenteral   |
| N° 007-DETS-IETSI-2020           | Drenaje torácico acanalado de silicona en espiral | Después de la cirugía cardíaca y/o torácica   |
| N° 006-DETS-IETSI-2020           | Óxido nítrico                                     | Pacientes pediátricos con hipertensión pulmonar severa para uso perioperatorio de cirugía cardíaca  |
| N° 005-DETS-IETSI-2020           | Isavuconazol                                      | Pacientes adultos con aspergilosis invasiva y con falla o intolerancia a voriconazol oral y posaconazol oral  |
| N° 004-DETS-IETSI-2020           | Tirotropina recombinante                          | Pacientes adultos posoperados de cáncer de tiroides diferenciado que requieren terapia radioablativa y no tienen contraindicación de suspensión del reemplazo hormonal con hormona tiroidea exógena   |
| N° 003-DETS-IETSI-2020           | Cobimetinib más vemurafenib                       | Pacientes adultos con melanoma metastásico no resecable con progresión a nivolumab y quimioterapia con mutación BRAF V600   |
| N° 002-DETS-IETSI-2020           | Talco estéril                                     | Pacientes adultos con efusión pleural maligna   |
| N° 001-DETS-IETSI-2020           | Catéter de mapeo de alta densidad                 | Pacientes con arritmias complejas que requieren ablación cardíaca   |
| N° 053-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2019 | Tirotropina recombinante                          | Posoperados de cáncer de tiroides diferenciado que requieren terapia radioablativa y tienen contraindicación de suspensión del reemplazo hormonal con hormona tiroidea exógena  |
| N° 052-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2019 | Secukinumab/Ustekinumab                           | Pacientes adultos con psoriasis vulgar severa, con antecedente de infecciones serias y falla terapéutica a etanercept   |
| N° 051-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2019 | Cinacalcet  | Hiperparatiroidismo primario con hipercalcemia persistente pese a terapia quirúrgica  |
| N° 050-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2019 | Lanreotida autogel                                | Acromegalia no controlados después de la cirugía  |
| N° 049-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2019 | Sacubitrilo/valsartán                             | Insuficiencia cardíaca crónica de fracción de eyección reducida grado funcional NYHA II-IV recibiendo terapia médica óptima a dosis máxima tolerable por un tiempo mínimo de seis meses que se encuentra hospitalizado por falla cardíaca descompensada |
| N° 048-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2019 | Nivolumab en combinación con ipilimumab           | Cáncer renal metastásico de células claras de pronóstico intermedio y pobre, sin tratamiento sistémico previo   |
| N° 046-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2019 | Secukinumab/ Ustekinumab                          | Psoriasis vulgar severa, con falla terapéutica a terapia sistémica convencional, fototerapia y terapia biológica con antagonistas del factor de necrosis tumoral disponibles en EsSalud   |
| N° 045-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2019 | Nivolumab   | Carcinoma renal de células claras avanzado, irreseccable, con progresión a dos líneas de terapia antiangiogénica  |
| N° 044-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2019 | Regorafenib                                       | Hepatocarcinoma avanzado, con progresión de enfermedad a sorafenib  |
| N° 043-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2019 | Nivolumab   | Hepatocarcinoma avanzado, irreseccable, con progresión de enfermedad a una línea de tratamiento con sorafenib   |




| Dictamen Preliminar              | Producto Farmacéutico  | Problema de Salud   |
|----------------------------------|--|---|
| N° 042-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2019 | Iloprost más sildenafilo                                     | Pacientes gestantes con hipertensión arterial pulmonar de clase funcional III   |
| N° 041-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2019 | Erlotinib  | Cáncer de pulmón de células no pequeñas, metastásico o irreseccable, con mutación del gen receptor del factor de crecimiento epidérmico, tras fallo a al menos una línea de quimioterapia   |
| N° 040-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2019 | Aglucosidasa alfa  | Pacientes pediátricos con enfermedad de Pompe de inicio en la infancia  |
| N° 039-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2019 | Inmunoglobulina  | Neuropatía motora multifocal  |
| N° 038-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2019 | Rituximab  | Granulomatosis con poliangeítis o poliangeítis microscópica no tributarios de tratamiento con ciclofosfamida  |
| N° 037-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2019 | Tiotepa  | Pacientes pediátricos con diagnóstico de meduloblastoma de alto riesgo candidatos a trasplante autólogo de células progenitoras hematopoyéticas   |
| N° 036-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2019 | Daratumumab más lenalidomida y dexametasona                  | Pacientes adultos con mieloma múltiple refractarios o en recaída luego de al menos una línea de tratamiento   |
| N° 035-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2019 | Ivabradina   | Pacientes adultos con falla cardíaca y fracción de eyección reducida, que permanecen sintomáticos a pesar del tratamiento con la terapia médica óptima, con un enfoque sobre el potencial rol de modificador de efecto de la frecuencia cardíaca                                      |
| N° 034-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2019 | Pembrolizumab  | Cáncer gástrico avanzado PD-L1 >1% y con progresión de enfermedad al menos a dos líneas de quimioterapia previas, basadas en fluoropirimidinas y platinos   |
| N° 033-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2019 | Globulina antitrombocítica de origen equino                  | Anemia aplásica severa, sin tratamiento previo, no tributarios a trasplante o postrasplantados no tributarios a segundo trasplante  |
| N° 032-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2019 | Fórmula extensamente hidrolizada a base de proteína de arroz | Pacientes pediátricos con diagnóstico de alergia alimentaria severa a la leche de vaca y que además presentan alergia o intolerancia a la fórmula a base de aminoácidos libres  |
| N° 031-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2019 | Pasireotide  | Enfermedad de Cushing persistente recurrente o recidivante a recesión de tumor hipofisario, en pacientes con contraindicación de adenectomía transesfenoidal  |
| N° 030-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2019 | Octreotide de liberación lenta (octreotide LAR)              | Tumor neuroendocrino pancreático bien diferenciado, metastásico o no resecable, sin tratamiento sistémico previo  |
| N° 029-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2019 | Osimertinib  | Cáncer de pulmón de células no pequeñas localmente avanzado o metastásico, irreseccable, con mutación del receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR) y progresión a una línea de tratamiento con inhibidores de tirosina quinasa del EGFR, positivos para la mutación T790M |
| N° 028-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2019 | Octreotide de liberación lenta (octreotide LAR)              | Tumor neuroendocrino gastrointestinal o de origen primario desconocido, metastásico o no resecable, sin tratamiento sistémico previo  |
| N° 027-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2019 | Esquemas de antivirales de acción directa                    | Pacientes con hepatitis C crónica   |
| N° 026-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2019 | Blinatumomab   | Leucemia linfoblástica aguda de precursores de células B, philadelphia negativo, en recaída y/o refractario   |
| N° 025-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2019 | Empagliflozina   | Diabetes mellitus tipo 2 no controlada, con enfermedad cardiovascular establecida   |



| Dictamen Preliminar              | Producto Farmacéutico                        | Problema de Salud   |
|----------------------------------|--|---|
| N° 024-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2019 | Teriflunomida                                | Esclerosis múltiple remitente-recurrente, enfermedad activa y falla al uso de interferón beta-1b  |
| N° 023-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2019 | Fingolimod                                   | Esclerosis múltiple recurrente remitente muy activa, de evolución rápida, sin tratamiento previo  |
| N° 022-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2019 | Nelarabina                                   | Pacientes pediátricos con leucemia linfoblástica aguda de células T con recaída o refractariedad a dos líneas de quimioterapia  |
| N° 045-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2018 | Idursulfasa                                  | Síndrome de Hunter  |
| N° 044-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2018 | Palbociclib más letrozol                     | Cáncer de mama metastásico con receptores hormonales positivos, HER2 negativo y sin tratamiento endocrino previo  |
| N° 043-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2018 | Aflibercept                                  | Tratamiento de la vasculopatía coroidea polipoidal refractaria a antiangiogénicos (bevacizumab o ranibizumab)   |
| N° 042-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2018 | Nivolumab                                    | Carcinoma epidermoide de cabeza y cuello recurrente y/o metastásico, irreseccable, con progresión de enfermedad a una línea de quimioterapia basada en platio                                     |
| N° 041-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2018 | Elbasvir/Grazoprevir                         | Infección crónica por hepatitis C genotipo 1a, previamente tratados con IFN-PEG/RBV, en estadio F4 (Child-Pugh A), con riesgo de interacciones medicamentosas                                     |
| N° 040-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2018 | Obinutuzumab más bendamustina                | Pacientes adultos con linfoma no Hodgkin indolente (folicular) refractario o resistente a rituximab   |
| N° 039-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2018 | Tocilizumab                                  | Artritis idiopática juvenil poliarticular con falla a AINES, corticoides, metotrexato y anti-TNF $\alpha$   |
| N° 038-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2018 | Insulina glargina                            | Diabetes mellitus tipo 2 mal controlada en tratamiento basal-bolo con análogos de la insulina, que persisten con episodios de hipoglucemia severa a predominio nocturno                           |
| N° 037-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2018 | Tofacitinib                                  | Artritis reumatoide activa moderada a severa con falla a anti-TNF y anti-CD20   |
| N° 036-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2018 | Pembrolizumab                                | Pacientes adultos con linfoma de Hodgkin clásico recurrente o refractario a más de tres líneas de quimioterapia, post trasplante de células hematopoyéticas autólogo o no candidatos a trasplante |
| N° 035-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2018 | Infliximab/Adalimumab                        | Pacientes con espondilitis anquilosante activa y respuesta inadecuada a etanercept  |
| N° 034-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2018 | Adalimumab                                   | Colitis ulcerativa moderada a severa, refractaria a tratamiento convencional y anti-TNF (infliximab)  |
| N° 031-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2018 | Nivolumab                                    | Cáncer de cabeza y cuello recurrente, metastásico, y con progresión luego de al menos tres líneas de quimioterapia  |
| N° 030-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2018 | Sirolimus                                    | Linfangioleiomiomatosis   |
| N° 029-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2018 | Adalimumab                                   | Pacientes pediátricos con uveítis no infecciosa y falla al tratamiento conservador  |
| N° 028-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2018 | Indacaterol en combinación con glicopirronio | Pacientes adultos con EPOC de los grupos B, C y D, y falla a tratamiento con LABA o LAMA  |
| N° 027-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2018 | Trióxido de arsénico                         | Leucemia promielocítica aguda en recaída  |
| N° 026-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2018 | Bromuro de tiotropio (monoterapia)           | Pacientes con EPOC de los grupos C y D  |



| Dictamen Preliminar              | Producto Farmacéutico                 | Problema de Salud   |
|----------------------------------|---------------------------------------|---|
| N° 025-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2018 | L- carnitina                          | Deficiencia primaria sistémica de carnitina   |
| N° 024-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2018 | Everolimus                            | Tumor neuroendocrino, metastásico con progresión a octreótide   |
| N° 023-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2018 | Hemina humana                         | Crisis aguda de porfiria aguda intermitente   |
| N° 022-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2018 | Bevacizumab más quimioterapia         | Cáncer de cuello uterino metastásico en pacientes que han progresado a primera línea de quimioterapia   |
| N° 021-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2018 | Secukinumab                           | Espondilitis anquilosante activa con respuesta inadecuada a tratamiento con etanercept, infliximab, y adalimumab  |
| N° 014-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2018 | Remifentanilo                         | Pacientes con indicación de cirugía de columna vertebral que requieran monitoreo neurofisiológico intraoperatorio bajo anestesia general  |
| N° 060-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2017 | Brentuximab vedotin                   | Linfoma Hodgkin (CD30+), con recaída/recurrencia post trasplante de médula ósea   |
| N° 058-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2017 | Ibrutinib                             | Leucemia linfática crónica/linfoma linfocítico de células pequeñas en pacientes recaídos y refractarios a múltiples líneas de tratamiento   |
| N° 057-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2017 | Enzalutamida                          | Cáncer de próstata metastásico, resistente a castración, progresivo a quimioterapia a base de docetaxel y comorbilidades cardiovasculares   |
| N° 055-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2017 | 99mTC-Ciprofloxacina                  | Uso en gammagrafías óseas para la detección de infecciones en prótesis articulares  |
| N° 053-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2017 | Pomalidomida combinación dexametasona | Mieloma múltiple que han fallado a tratamiento con lenalidomida y bortezomib, trasplantados o no trasplantados  |
| N° 052-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2017 | Regorafenib                           | GIST metastásico con progresión de enfermedad luego de imatinib y sunitinib   |
| N° 051-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2017 | Sunitinib                             | GIST metastásico con progresión de enfermedad al tratamiento de imatinib  |
| N° 049-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2017 | Denosumab                             | Tumor óseo de células gigantes, en pacientes con enfermedad metastásica   |
| N° 048-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2017 | Mifamurtida                           | Osteosarcoma osteoblástico no metastásico sin tratamiento sistémico previo, en el contexto de neoadyuvancia con quimioterapia MAPI  |
| N° 047-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2017 | Ramucirumab más paclitaxel            | Cáncer gástrico o de la unión esofagogástrica metastásico o localmente avanzando irreseccable con progresión de enfermedad luego de quimioterapia de primera línea a base de fluoropirimidinas y sales de platino |
| N° 046-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2017 | Palbociclib más fulvestrant           | Cáncer de mama metastásico con receptores hormonales positivos, HER2 negativo, y que progresan al menos a dos líneas de hormonoterapia y dos líneas de quimioterapia  |
| N° 045-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2017 | Nivolumab                             | Cáncer de pulmón de células no pequeñas (NSCLC) tipo no escamoso, metastásico, y progresivo a primera línea de tratamiento con quimioterapia basada en platino  |
| N° 044-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2017 | Adalimumab                            | Artritis psoriásica refractarios a terapia convencional y a etanercept e infliximab   |






| Dictamen Preliminar              | Producto Farmacéutico                    | Problema de Salud  |
|----------------------------------|--|--|
| N° 043-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2017 | Ibrutinib                                | Macroglobulinemia de Waldenström que han recibido por lo menos tres líneas de tratamiento previo   |
| N° 042-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2017 | Omalizumab                               | Niños y adolescentes con diagnóstico de asma alérgica severa no controlada   |
| N° 041-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2017 | Ticagrelor                               | Síndrome coronario agudo (SCA) en quienes se planea realizar una intervención coronaria percutánea   |
| N° 040-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2017 | Pemetrexed más quimioterapia (platino)   | Tratamiento de primera línea del mesotelioma maligno pleural estadio clínico IV, y III no operable   |
| N° 039-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2017 | Furoato de fluticasona                   | Rinitis alérgica perenne que no responden a los antihistamínicos orales  |
| N° 038-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2017 | L-arginina                               | Pacientes pediátricos con defectos del ciclo de la urea  |
| N° 037-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2017 | Regorafenib                              | Cáncer colorrectal metastásico con progresión de enfermedad al menos a dos líneas de quimioterapia previas   |
| N° 036-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2017 | Remifentanilo                            | Inducción y mantenimiento de la anestesia durante trasplante hepático  |
| N° 035-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2017 | Brentuximab Vedotin                      | Linfoma de Hodgkin CD30+ que han recaído o son refractarios a dos o más líneas de quimioterapia y que son tributarios de trasplante de células hematopoyéticas                               |
| N° 034-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2017 | Teriparatida                             | Osteoporosis severa refractario a bisfosfonatos  |
| N° 033-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2017 | Bromuro de tiotropio                     | Pacientes con asma severa no controlada con ICS/LABA y LTRA, y no tributarios a teofilina  |
| N° 032-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2017 | Inmunoglobulina humana                   | Polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica idiopática y respuesta inadecuada a corticoides e inmunosupresores   |
| N° 031-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2017 | L-asparaginasa E.coli pegilada           | Leucemia linfoblástica aguda que presentan hipersensibilidad a L-asparaginasa E. coli nativa, en el contexto de no disponibilidad de L-asparaginasa Erwinia                                  |
| N° 030-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2017 | Brentuximab Vedotin                      | Linfoma de Hodgkin CD30+ que han recaído o tienen enfermedad refractaria al menos a dos líneas de quimioterapias previas y no son candidatos a recibir trasplante de células hematopoyéticas |
| N° 028-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2017 | Amfotericina B liposomal (Tercera línea) | Aspergilosis invasiva y reacción adversa a voriconazol y amfotericina B deoxicolato  |
| N° 026-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2017 | Metilfenidato de liberación prologada    | Trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad  |
| N° 088-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016 | Adalimumab                               | Espondilitis anquilosante en pacientes con falla a tratamiento con dos anti-TNFs   |
| N° 086-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016 | Sunitinib                                | Cáncer renal de células no claras (cromóforo) con enfermedad metastásica irreseccable  |
| N° 085-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016 | Golimumab                                | Artritis psoriásica refractaria a FARMES, etanercept e infliximab  |
| N° 084-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016 | Nab-Paclitaxel más gemcitabina           | Adenocarcinoma de páncreas metastásico sin tratamiento sistémico previo  |



| Dictamen Preliminar              | Producto Farmacéutico                    | Problema de Salud  |
|----------------------------------|--|--|
| N° 082-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016 | Liraglutida                              | Diabetes mellitus tipo 2 y sobrepeso, sin control metabólico adecuado (según HbA1c) a pesar de tratamiento bolo-basal con dosis altas de insulina                              |
| N° 080-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016 | Posaconazol                              | Pacientes pediátricos con mucormicosis y tratamiento previo con anfotericina B   |
| N° 079-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016 | Ruxolitinib                              | Mielofibrosis primaria con respuesta inadecuada a terapia estándar inicial   |
| N° 078-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016 | Rifaximina alfa                          | Encefalopatía hepática refractaria al uso de lactulosa   |
| N° 077-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016 | Buprenorfina parche transdérmico         | Dolor crónico oncológico moderado a severo que no toleran otro tratamiento analgésico por vía oral, vía endovenosa o vía subcutánea.   |
| N° 075-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016 | Cetuximab a FOLFIRi                      | Tratamiento de primera línea en pacientes con carcinoma colorrectal metastásico con gen KRAS no mutado (wild type) e irreseccable  |
| N° 074-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016 | Solifenacina                             | Hiperactividad vesical refractarios a oxibutina  |
| N° 073-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016 | Anidulafungina                           | Pacientes no neutropénicos con candidemia y respuesta inadecuada o reacción adversa a fluconazol   |
| N° 072-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016 | Azacitidina                              | Síndrome Mielodisplásico de bajo riesgo o intermedio-I con alto requerimiento transfusional con falla al tratamiento con primera línea   |
| N° 070-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016 | Nilotinib                                | Leucemia mieloide crónica con resistencia o intolerancia a imatinib y dasatinib, sin mutación T315I  |
| N° 069-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016 | Everolimus en combinación con octreótide | Tumor neuroendocrino pancreático bien diferenciado en pacientes sintomáticos, con enfermedad metastásica irreseccable sin terapia sistémica previa                             |
| N° 068-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016 | Omalizumab                               | Asma alérgica persistente severa no controlada con el tratamiento estándar optimizado (refractaria)  |
| N° 067-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016 | Everolimus en combinación exemestano     | Cáncer de mama metastásico, receptores hormonales positivos, HER2 negativo, que ha progresado a inhibidores de aromataasa no esteroideos y a más de una línea de quimioterapia |
| N° 066-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016 | Eltrombopag/Romiplostim                  | Purpura trombocitopénica idiopática refractaria a primera y segunda línea  |
| N° 065-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016 | Nivolumab                                | Melanoma avanzado (irreseccable o metastásico)   |
| N° 064-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016 | Eltrombopag                              | Aplasia medular severa, no tributarios a terapia triple inmunosupresora ni trasplante de médula ósea   |
| N° 063-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016 | Denosumab                                | Tumor óseo de células gigantes, en pacientes con enfermedad localmente avanzada e irreseccable   |
| N° 062-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016 | Tobramicina en polvo seco                | Bronquiectasias no asociadas a fibrosis quística colonizadas por pseudomona aeruginosa   |
| N° 061-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016 | Pembrolizumab (Primera línea)            | Melanoma maligno con enfermedad metastásica o irreseccable, sin tratamiento sistémico previo   |
| N° 059-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016 | Tocilizumab                              | Artritis idiopática juvenil en pacientes con falla al tratamiento con AINEs, glucocorticoides y FARMEs   |
| N° 058-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016 | Ticagrelor (Segunda línea)               | Pacientes con re-infarto por trombosis de stent por falla a la terapia de doble antiagregación plaquetaria clopidogrel más aspirina  |



| Dictamen Preliminar              | Producto Farmacéutico   | Problema de Salud   |
|----------------------------------|---|---|
| N° 057-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016 | Ticagrelor<br>(Primera línea)   | Pacientes con síndrome coronario agudo, intervención percutánea, e intolerancia a la aspirina   |
| N° 056-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016 | Sorafenib   | Carcinoma de tiroides diferenciado, metastásico, irreseccable, refractario a tratamiento con yodo radioactivo   |
| N° 055-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016 | Adalimumab  | Psoriasis severa, sin respuesta óptima a infliximab y etanercept  |
| N° 054-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016 | Adalimumab  | Enfermedad de Crohn severa en pacientes con falla al tratamiento con infliximab   |
| N° 053-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016 | Fórmula semielemental con bajo contenido en grasa y alto contenido en triglicéridos de cadena media | Defecto de la Beta oxidación de ácidos grasos de la cadena larga  |
| N° 052-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016 | Inmunoglobulina intravenosa   | Enfermedad de Kawasaki fase aguda   |
| N° 051-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016 | Triamcinolona intralesional   | Cicatrices hipertróficas o queloides post quemaduras  |
| N° 050-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016 | Fulvestrant   | Cáncer de mama metastásico con receptores hormonales positivos, no tributarios a quimioterapia, que ha progresado a inhibidores de aromatasa no esteroideos |
| N° 049-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016 | Rituximab combinación con azatioprina o mofetil micofenolato  | Pénfigo refractario y con contraindicación a uso de corticoides por eventos adversos serios   |
| N° 048-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016 | Axitinib  | Cáncer renal metastásico con tratamiento previo con sunitinib   |
| N° 047-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016 | Bosentan  | Hipertensión pulmonar asociada a insuficiencia cardíaca avanzada, candidatos a trasplante cardíaco  |
| N° 046-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016 | Posaconazol   | Mucormicosis y respuesta inadecuada o eventos adversos al uso de amfotericina B   |
| N° 044-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016 | Maraviroc   | VIH-1 con tropismo CCR5 positivo, en pacientes multidrogoresistentes en estadio SIDA  |
| N° 042-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016 | Bevacizumab   | Glioblastoma multiforme recurrente, irreseccable y terapia previa con temozolamida  |
| N° 041-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016 | Tirotropina recombinante humana (rhTSH)   | Rastreo corporal con radioyodo en pacientes con cáncer diferenciado de tiroides   |
| N° 032-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016 | Fórmula nutricional libre de fenilalanina   | Fenilcetonuria  |
| N° 023-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016 | Fórmula extensamente hidrolizada  | Síndrome de intestino corto y/o falla intestinal  |
| N° 018-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016 | Fórmula a base de aminoácidos libres  | Síndrome de intestino corto y/o falla intestinal  |
| N° 014-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016 | Fórmula nutricional a base de aminoácidos libres  | Alergia alimentaria severa mediada o no por IgE, luego de fracaso a fórmulas extensamente hidrolizadas  |



| Dictamen Preliminar              | Producto Farmacéutico   | Problema de Salud  |
|----------------------------------|---|--|
| N° 011-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016 | Fórmula nutricional semielemental con alto contenido de TCM                   | Quilotórax congénito o adquirido   |
| N° 006-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2015 | Paricalcitol  | Hiperparatiroidismo secundario en pacientes con enfermedad renal en estadio V  |
| N° 005-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2015 | Flúor 18 Fluorodexosiglucosa (F18-FDG) en tomografía de emisión de positrones | Patologías oncológicas / en tomografías de emisión de positrones (PET)   |
| N° 003-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2015 | Erlotinib (Segunda línea) / Afatinib (Segunda línea)                          | Cáncer de pulmón de células no pequeñas metastásico con mutación en el gen (EGFR)  |
| N° 002-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2015 | Afatinib (Primera línea)  | Cáncer de pulmón de células no pequeñas y mutación en el dominio del gen receptor de crecimiento epidérmico (EGFR)                   |
| N° 001-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2015 | Iloprost  | Hipertensión pulmonar en pacientes en riesgo de falla del ventrículo derecho agudo en periodo perioperatorio de una cirugía cardíaca |

