


Flujograma manejo de pacientes con Dengue

con signos de alarma (DCSA) en el adulto y gestante - Grupo B2

DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA (DCSA) EN EL ADULTO Y GESTANTE - GRUPO B2

LLENAR FICHA CLÍNICO-
EPIDEMIOLÓGICA Y NOTIFICAR



Fuente: NTS N° 211-MINSA/DGIESP-2024. Norma Técnica de Salud para la atención integral de pacientes con dengue en el Perú. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/5323501-175-2024-minsa>

Flujograma manejo de pacientes con Dengue

con signos de alarma (DCSA) en el niño - Grupo B2

DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA (DCSA) EN EL NIÑO - GRUPO B2

LLENAR FICHA CLÍNICO-
EPIDEMIOLÓGICA Y NOTIFICAR

Solución cristalóide (Lactato de Ringer o solución salina normal 0.9%) 5 a 7 mL/kg/h en 1 hora.

REEVALUAR: HAY
MEJORÍA CLÍNICA Y
DIURESIS ADECUADA

Reducir goteo 3 a 5 mL/Kg/h
por 2 - 4 horas más
monitoreo cada hora

REEVALUAR: HAY MEJORÍA
CLÍNICA Y DIURESIS
ADECUADA

Reducir goteo 2 a 3 mL/Kg/h
por 2 a 4 horas más
monitoreo cada hora

REEVALUAR: HAY MEJORÍA
CLÍNICA Y DIURESIS
ADECUADA

Reducir gradualmente a
dosis de mantenimiento
100 mL/Kg/día y continuar
monitoreo

REEVALUAR: SIN MEJORÍA
CLÍNICA, NI SOBRECARGA
DE LÍQUIDO

Repetir 2da carga de 5 a 7
mL/Kg/h en 1 hora más
monitoreo cada hora

REEVALUAR: SIN MEJORÍA
CLÍNICA, NI SOBRECARGA
DE LÍQUIDO

Repetir 3ra carga de 5 a 7
mL/Kg/h en 1 hora más
monitoreo cada hora

REEVALUAR: SIN MEJORÍA
CLÍNICA, NI SOBRECARGA
DE LÍQUIDO

Clasificar como dengue
grave y manejar como
Grupo C en niño

La mejoría clínica está dada por:

- Desaparición progresiva de los signos de choque.
- Signos vitales estables.
- Diuresis $\geq 1.5 - 2$ mL/kg/h en niños pequeños, ≥ 1 mL/kg/h en niños grandes.
- Buena tolerancia a la vía oral.
- Apetito, alimentación a pedido del paciente.

Fuente: NTS N° 211-MINSA/DGIESP-2024. Norma Técnica de Salud para la atención integral de pacientes con dengue en el Perú.
Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/5323501-175-2024-minsa>

Flujograma de manejo de Dengue

con signos de alarma (DCSA) en la persona

adulto mayor o comorbilidad - Grupo B2

DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA (DCSA) EN LA PERSONA ADULTO MAYOR O COMORBILIDAD - GRUPO B2

LLENAR FICHA CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICA Y NOTIFICAR



Solución cristaloides (Lactato de Ringer o solución salina normal 0.9%) 5 mL/kg en 1 hora

REEVALUAR: HAY MEJORÍA CLÍNICA Y DIURESIS ≥ 1 mL/Kg/h

Reducir goteo a 4 mL/kg/h Durante 2 - 4 horas más monitoreo cada hora

REEVALUAR: HAY MEJORÍA CLÍNICA Y DIURESIS ≥ 1 mL/Kg/h

Reducir goteo 3 mL/kg/h durante 2-4 horas más monitoreo cada hora

REEVALUAR: HAY MEJORÍA CLÍNICA Y DIURESIS ≥ 1 mL/Kg/h

Reducir goteo a 2 mL/Kg/h durante 2-4 horas más monitoreo cada hora

REEVALUAR: SIN MEJORÍA CLÍNICA, NI SOBRECARGA DE LÍQUIDO

Repetir 2da carga de 5 mL/Kg en 1 hora más monitoreo cada hora

REEVALUAR: SIN MEJORÍA CLÍNICA, NI SOBRECARGA DE LÍQUIDO

Repetir 3ra carga de 5 mL/Kg en 1 hora más monitoreo cada hora

REEVALUAR: SIN MEJORÍA CLÍNICA, NI SOBRECARGA DE LÍQUIDO

Clasificar como dengue grave y manejar como Grupo C en la persona adulto mayor

La mejoría clínica está dada por:

- Desaparición progresiva de los signos de alarma
- Remisión progresiva de la sintomatología general
- Signos vitales estables
- Diuresis normal o aumentada
- Disminución del hematocrito a menos del valor base en un paciente estable
- Buena tolerancia a la vía oral
- Recuperación del apetito

Fuente: NTS N° 211-MINSA/DGIESP-2024. Norma Técnica de Salud para la atención integral de pacientes con dengue en el Perú. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/5323501-175-2024-minsa>