

ANEXO N° 9. CONDICIONES DE USO

El paciente considerado para recibir pembrolizumab más carboplatino y paclitaxel debe cumplir con los siguientes criterios clínicos. Estos criterios deben ser acreditados por el médico oncólogo al momento de solicitar la aprobación del medicamento al Comité Farmacoterapéutico correspondiente en cada paciente específico (ETS MC N° 03-2024):

Diagnóstico/ condición de salud	Pacientes adultos con cáncer de pulmón de células no pequeñas metastásico, escamoso, con genes EGFR o ALK no mutados, sin tratamiento sistémico previo‡
Grupo etario	18 años o más
Tiempo máximo que el Comité Farmacoterapéutico puede aprobar el uso del medicamento en cada paciente	6 meses
Condición clínica del paciente para ser apto de recibir el medicamento	Se debe acreditar con documentos de la historia clínica todos los siguientes criterios: <ul style="list-style-type: none">- Paciente con el diagnóstico de base cáncer de pulmón de células no pequeñas, metastásico, escamoso con genes EGFR y ALK no mutados.- Pacientes sin metástasis cerebral activa (demostrada por TAC o RM).- TAC de tórax, abdomen y pelvis.- Paciente no debe tener enfermedad autoinmune activa que ha requerido tratamiento sistémico en los últimos 2 años.- Paciente no debe tener enfermedad pulmonar intersticial o antecedentes de neumonitis que haya requerido uso de corticoides sistémicos (exceptuando dosis de prednisona menos 10mg o equivalente).- ECOG 0-2
Presentar la siguiente información en los reportes de seguimiento	Presentar la siguiente información después de iniciado el tratamiento. <ul style="list-style-type: none">- Hemograma completo, pruebas de función renal y hepática.- Perfil tiroideo.- Evidencia de no progresión.
Criterios para la suspensión del medicamento	<ul style="list-style-type: none">- Intolerancia, reacción alérgica o sospecha de reacción adversa seria al producto.- Falta de respuesta clínica.- Otros según información de la etiqueta del producto.

Abreviaturas utilizadas: EGFR: receptor del factor de crecimiento epidérmico; ALK: cinasa del linfoma anaplásico
‡ En el contexto de primera línea para enfermedad metastásica, independientemente de que haya recibido terapia adyuvante o neoadyuvante