


Flujograma 1: Evaluación diagnóstica ante sospecha etiológica de diarrea o gastroenteritis aguda infecciosa



Notas aclaratorias:

* En diarrea aguda acuosa, la etiología más frecuente es viral, especialmente en lactantes y niños menores de 5 años. El diagnóstico debe basarse principalmente en la clínica, evolución del cuadro y contexto epidemiológico. Las pruebas antigénicas para rotavirus/adenovirus solo se consideran en los casos específicos definidos en la presente GPC.

** En diarrea aguda disintérica, ante la sospecha de etiología bacteriana, idealmente solicitar coprocultivo. Cuando exista sospecha de infección por *Entamoeba histolytica*, solicitar parasitológico seriado en heces (3 muestras).

† Está contraindicado el uso de antibióticos, pues podría incrementarse el riesgo de síndrome urémico hemolítico (SUH).


‡ En casos confirmados o altamente sospechosos de infección por *V. cholerae* O1 u O139 (cólera), se recomienda antibioticoterapia específica según la sensibilidad local, como complemento a la rehidratación.

El uso de pruebas diagnósticas debe restringirse a los escenarios clínicos descritos en esta GPC y no indicarse de forma rutinaria.

Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación. Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico y Tratamiento de la Diarrea o Gastroenteritis aguda infecciosa en niños menores de 5 años

Disponible en: <https://ietsi.essalud.gob.pe/gpc-guias-de-practica-clinica/>

Flujograma 2. Manejo terapéutico de la diarrea o gastroenteritis aguda infecciosa



Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación. Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico y Tratamiento de la Diarrea o Gastroenteritis aguda infecciosa en niños menores de 5 años

Disponible en: <https://ietsi.essalud.gob.pe/gpc-guias-de-practica-clinica/>