


Flujograma 1: Prevención de la hemorragia postparto



Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación. Guía de Práctica Clínica para la Prevención, Diagnóstico y Manejo de la Hemorragia Postparto: Guía en Versión Corta. Lima: EsSalud; 2025
 Disponible en: <https://ietsi.essalud.gob.pe/gpc-guias-de-practica-clinica/>

Flujograma 2: Diagnóstico de hemorragia postparto

Mensajes clave:

La evaluación de la pérdida de sangre es clave en la 1era hora postparto.

A través de **Monitorización de signos de alarma** producidos por la pérdida excesiva de sangre c/15min.

Puérpera con sospecha de Hemorragia postparto

¿Presenta signos de alarma debido a pérdida excesiva de sangre (alteraciones en el estado de conciencia, perfusión, taquicardia e hipotensión)?

NO

SÍ

Como primera línea calcular el índice de shock (FC/PAS)
Usar métodos objetivos de cuantificación (gravimétrico o volumétrico*) de ser factible.

Índice de shock menor a 0.9 y/o sangrado cuantificado < 1000ml

No hemorragia postparto

Continuar con manejo expectante

Índice de shock mayor o igual a 0.9 y/o sangrado cuantificado $\geq 1000\text{ml}$

Diagnóstico de hemorragia postparto

inmediatamente

Activar clave roja obstétrica y valorar el grado de shock hipovolémico.


Solicitar exámenes de laboratorio: hemograma, PT/PTT/INR, fibrinógeno, pruebas bioquímicas: urea, creatinina y gases arteriales si previamente no se ha solicitado.

***Métodos gravimétricos:** Pesar gasas de pérdida de sangre (gasas, apósitos, sábanas) y restar el peso seco.

***Métodos volumétricos:** Medir el volumen de sangrado mediante campos, bolsas o cilindros para recolección de sangre.


Flujograma 3: Manejo del shock hipovolémico en hemorragia postparto

Mensaje clave: **Aplicar este flujograma desde el minuto 0 del diagnóstico, de preferencia no exceder los 20 minutos.**



Flujograma 4: Manejo de hemorragia postparto

Mensaje clave: **Aplicar este flujograma desde el minuto 0 del diagnóstico, de preferencia no exceder los 20 minutos.**



LEYENDA

Recomendación fuerte

Recomendación condicional

Buena Práctica Clínica (BCP)

Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación. Guía de Práctica Clínica para la Prevención, Diagnóstico y Manejo de la Hemorragia Postparto: Guía en Versión Corta. Lima: EsSalud; 2025

Disponible en: <https://ietsi.essalud.gob.pe/gpc-guias-de-practica-clinica/>