

BS-62	30105163	Suero anti D monoclonal	CM3	I-III	PRESENTACIÓN: Frasco hasta por 10 ml. de Suero anti D, con gotero, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERÍSTICAS: Reactivo con anticuerpos monoclonales IgG e IgM. Titulo de 64 dils. y avidéz menor de 60 segundos (como mínimo). USO: Determinación del grupo sanguíneo Rh en lámina o en tubo.
BS-63	30106008	Suero anti D policlonal	CM3	I-III	PRESENTACIÓN: Frasco hasta por 10 ml. de Suero anti D, con gotero, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERÍSTICAS: Reactivo con anticuerpos policlonales de origen humano. Titulo de 64 dils. y avidéz menor de 60 segundos (como mínimo). USO: Determinación del grupo sanguíneo Rh en lámina o en tubo.
BS-64	30103794	Suero anti DCE	CM3	Centro de Hemoterapia II	PRESENTACIÓN: Frasco hasta por 10 ml. de Suero anti DCE, con gotero, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERÍSTICAS: Reactivo con anticuerpos monoclonales ó policlonales. USO: Determinación del Fenotipo DCE en lámina o en tubo.
BS-65	30104299	Suero anti Di ^a	CM3	Centro de Hemoterapia II	PRESENTACIÓN: Frasco hasta por 5 ml. de Suero anti Di ^a , con gotero, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERÍSTICAS: Reactivo con anticuerpos monoclonales ó policlonales. USO: Determinación del Fenotipo Di ^a en lámina o en tubo.
BS-66	30104300	Suero anti Di ^b	CM3	Centro de Hemoterapia II	PRESENTACIÓN: Frasco hasta por 5 ml. de Suero anti Di ^b , con gotero, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERÍSTICAS: Reactivo con anticuerpos monoclonales ó policlonales. USO: Determinación del Fenotipo Di ^b en lámina o en tubo.
BS-67	30105461	Suero anti E (Mayúscula)	CM3	Centro de Hemoterapia II	PRESENTACIÓN: Frasco hasta por 5 ml. de Suero anti E (mayúscula), con gotero, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERÍSTICAS: Reactivo con anticuerpos monoclonales ó policlonales. USO: Determinación del Fenotipo E (Mayúscula) en lámina o en tubo.
BS-68	30105463	Suero anti e (Minúscula)	CM3	Centro de Hemoterapia II	PRESENTACIÓN: Frasco hasta por 5 ml. de Suero anti e (minúscula), con gotero, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERÍSTICAS: Reactivo con anticuerpos monoclonales ó policlonales. USO: Determinación del Fenotipo e (Minúscula) en lámina o en tubo.
BS-69	30104301	Suero anti Fy ^a	CM3	Centro de Hemoterapia II	PRESENTACIÓN: Frasco hasta por 5 ml. de Suero anti Fy ^a , con gotero, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERÍSTICAS: Reactivo con anticuerpos monoclonales ó policlonales. USO: Determinación del Fenotipo Fy ^a en lámina o en tubo.
BS-70	30104303	Suero anti Fy ^b	CM3	Centro de Hemoterapia II	PRESENTACIÓN: Frasco hasta por 5 ml. de suero anti Fy ^b , con gotero, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERÍSTICAS: Reactivo con anticuerpos monoclonales ó policlonales. USO: Determinación del Fenotipo Fy ^b en lámina o en tubo.

NO VIGENTE

EXCLUIDO

NO VIGENTE

NO VIGENTE

NO VIGENTE



000071